ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ ГИПЕРИЦИНА ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА *DROSOPHILA MELANOGASTER*© 2014 Е.А. Юшкова^{1,2}, О.А. Старцева¹, Л.К. Рочева³, В.Г. Зайнуллин¹, В.В. Пунегов¹, Г.Г. Зайнуллин³, И.С. Боднар^{1,2}¹ Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар² Сыктывкарский Государственный университет, г. Сыктывкар³ Пущинский государственный естественно-научный институт, г. Пущино⁴ Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

Потупила 01.07.2014

Оценена биологическая активность и радиомодифицирующие свойства водорастворимой формы гиперидина на примере *Drosophila melanogaster*. Показано, что введение в диету хронически облученных (3,5 мГр/ч) дрозофил тестируемого препарата вызывает неоднозначные, зависящие от концентрации вещества, временных характеристик влияния каждого из факторов и генотипических особенностей животных, ответные реакции (по уровню плодовитости, выживаемости и частоте повреждений ДНК). В условиях совместного влияния облучения и гиперидина выход разрывов ДНК в клетках как линии дикого типа *Oregon-R* (при концентрации препарата 10 и 100 мкМ), так и линии *Sod^{Delta02/+}* (при концентрациях, не превышающих 100 мкМ) достоверно ниже уровня, индуцированного раздельным их действием. По показателям жизнеспособности наблюдали лишь единичные достоверные изменения в ответ на взаимодействие изучаемых агентов. Представленные данные свидетельствуют, что гиперидин обладает антиоксидантным действием в клетках облученных особей, имеющих нарушения в продукции Мп-содержащей супероксиддисмутазы.

Ключевые слова: дрозофила, ионизирующее излучение, водорастворимая форма гиперидина, уровень повреждений ДНК, выживаемость, митохондриальная супероксиддисмутаза (MnSod)

Поиск новых высокоэффективных препаратов, способных к модификации радиационных эффектов, является перспективным направлением при разработке радиационных защитных мер и в клинической радиологии. Многие, если не все, традиционные радиомодифицирующие средства проявляют свои свойства в высоких концентрациях и только при остром однократном облучении, а также имеют нестабильную химическую структуру [6]. В связи с этим определенный интерес вызывает гиперидин – пигмент, содержащийся в зверобое продырявленном (*Hypericum perforatum* L.). Известно, что гиперидин обладает антидепрессантным, антимикробным и фотосенсибилизирующими свойствами, и потому он нашел широкое применение в практической медицине, особенно в противоопухолевой терапии [7, 12, 14].

Однако современные препараты, содержащие гиперидин, малоэффективны вследствие низкой растворимости пигмента, эффективность которого увеличивается только в комбинации с другими химическими агентами (токсическими растворителями, водно-масляными эмульсиями). Отметим, что на сегодняшний день нет данных о модифицирующих свойствах гиперидина по отношению к действию облучения.

Новый, исследуемый нами, экспериментальный образец гиперидина, выделенный из надземной массы зверобоя, был переведен в гидрофильную форму путем иммобилизации его на наночастицах неорганической матрицы.

В настоящем исследовании мы изучили эффективность экспериментального образца гиперидина в модификации эффектов хронического облучения у дрозофилы, принимая во внимание возможность его роли в системе антиоксидантной защиты, участвующей в снижении уровня поврежденного ДНК [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовали дрозофил дикого типа (линия *Oregon-R*) и особей (линия *Sod^{Delta02/+}*) с мутацией гена митохондриальной Мп-супероксиддисмутазы, участвующей в работе антиоксидантной системы защиты [10]. Исследуемые генотипы развивались на питательной сахаро-агаровой дрожжевой среде, обработанной растворами гиперидина в разных концентрациях (1, 10, 20 и 100 мкМ). Время экспозиции гиперидина

Юшкова Елена Александровна, кандидат биологических наук, научный сотрудник, отдел радиоэкологии, ushkova@ib.komisc.ru; Старцева Ольга Александровна, аспирант, отдел радиоэкологии, startseva@ib.komisc.ru; Зайнуллин Владимир Габдуллович, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом радиоэкологии, vzainullin@ib.komisc.ru; Рочева Лилия Кирилловна, бакалавр, кафедра почвоведения, экологии и природопользования, LiliyaRocheva@gmail.com; Пунегов Василий Витальевич, кандидат химических наук, старший научный сотрудник, punegov@ib.komisc.ru; Зайнуллин Геннадий Габдуллович, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, лаборатория ультрадисперсных систем, zainullin@chemi.komisc.ru; Боднар Ирина Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник, отдел радиоэкологии, bodnar-irina@mail.ru

для всех выбранных концентраций зависело от анализируемого показателя и составило 5 (для оценки параметров предимагинальной выживаемости и частоты ДНК-разрывов в нейробластах личинок) и 6 (для оценки репродуктивного показателя) суток. Одновременно проводили хроническое облучение при мощности экспозиционной дозы 3,5 мГр/ч. Источником г-излучения служил ²²⁶Ra (56 мГр/ч). Все варианты содержали в одинаковых условиях: при температуре 25 ± 1 °С, 12-ти часовом режиме освещения.

Анализ эффективности гиперидина у облученных дрозофил определяли по уровню плодовитости, предимагинальной выживаемости и частоте цитогенетических нарушений (ДНК-разрывов), оцениваемый методом «ДНК-комет» в нейтральной версии рН [5]. Выживаемость, плодовитость дрозофил оценивали с применением стандартных методик [4, 8]. Совместное влияние гиперидина и облучения оценивали по коэффициенту взаимодействия K_w , который определяется как отношение инкремента ответной реакции организма на одновременное воздействие факторов к сумме инкрементов эффектов при их раздельном действии [1].

Статистический анализ данных проводили с использованием программы Statistica (версия 7.0.61.0, StatSoft, Inc., США, лицензия № 3145689012). Нормальность распределения показателей оценивали по Колмогорову-

Смирнову. Статистическую значимость различий показателей определяли с использованием процедуры ANOVA.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно [5], что водорастворимая форма гиперидина имеет высокую биологическую эффективность и обладает антиоксидантной активностью, осуществляемая преимущественно через MnSod-активацию. Эти сведения легли в основу исследования действия гиперидина по отношению к облучению на мутантах дрозофилы, характеризующихся сниженным уровнем синтеза Mn-супероксиддисмутазы. Экспериментальные данные показывают (рис.), что гидрофильная форма гиперидина практически при любой концентрации оказывает токсическое действие на интактные соматические клетки изучаемых генотипов *D. melanogaster*. В нейробластах особей линии дикого типа *Oregon-R* достоверное увеличение разрывов ДНК наблюдали при обработке препаратом во всех концентрациях (кроме 20 мкМ) и в клетках мутантной линии *Sod^{Delta02/+}* – только в концентрациях, не превышающих 20 мкМ. При этих же дозах гиперидина уровень предимагинальной выживаемости (табл. 2) и плодовитости (табл. 1) необлученных особей либо не имел достоверно значимых отличий от контрольных величин, либо был повышен примерно в 1,5-2 раза.

Рис. Уровень повреждений ДНК в нейробластах дрозофилы в контроле и при совместном/раздельном воздействии гиперидина и облучения.

Примечание: * $p < 0,05$, ** $p < 0,001$ по сравнению с соответствующим контролем и $a p < 0,05$, $b p < 0,01$ – относительно облученного варианта (0 мкМ).

При облучении биологическая эффективность гиперидина сильно отличается от его действия без физического фактора и зависит от концентрации. В результате цитогенетического анализа выявлено, что снижение радиационно-индуцированных в нейробластах ДНК-нарушений по сравнению с собственным контролем и облученным вариантом (без обработки гиперидином), а также с таковыми вариантами линии дикого типа *Oregon-R* отмечается при введении в диету дрозофил линии *Sod^{Delta02/+}* гиперидина в низких (1 мкМ) и медианных концентрациях (10-20 мкМ). По показателям жизнеспособности, оценивающие реакции животных на уровне организма, согласно дисперсионному анализу наблюдали лишь единичные достоверные изменения в ответ на совместное действие облучения и гиперидина. При этом взаимодействие химического и радиационного факторов выявлено преимущественно у особей, имеющих низкий уровень эндоген-

ных антиоксидантов (*Sod^{Delta02/+}*). По сравнению с облученным вариантом (0 мкМ) у особей, в диету которых входило 10 мкМ гиперидина, репродуктивный потенциал в условиях хронического облучения был достоверно ($p < 0,05$) выше примерно в 1,7 раза (табл. 1). В то время как при той же концентрации гиперидина выживаемость животных, находящихся на ранних стадиях индивидуального развития, была снижена в 1,4 раза (табл. 2). Исходя из этих данных, помимо антиоксидантных свойств, в механизмах радиомодифицирующего действия гиперидина, по-видимому, определенную роль может играть его влияние на пролиферативную и функциональную активность эмбриональных клеток. Отметим, что именно на ранних стадиях развития клетки дрозофил испытывают массовую пролиферацию и дифференциацию, что обуславливает их повышенную радиочувствительность [2, 3].

Таблица 1. Плодовитость (кол-во эмбрионов на самку) после воздействия гиперидина и хронического облучения при мощности 3.5 мГр/ч (накопленная доза за 12 дней составила 1 Гр).

Концентрация, мкМ	Линия			
	<i>Oregon-R</i>		<i>Sod^{Delta02/+}</i>	
	Контроль	Облучение	Контроль	Облучение
0	21.5 ± 3.0	32.5 ± 1.6*	18.7 ± 0.9	12.4 ± 0.7*
1	27.9 ± 2.2	39.8 ± 1.9*	18.0 ± 1.3	11.6 ± 1.1*
10	21.9 ± 1.9	34.7 ± 1.7*	25.4 ± 1.5 ^a	20.5 ± 0.9 ^c
20	40.7 ± 4.7 ^b	30.8 ± 3.2	20.1 ± 1.5	15.7 ± 1.4*
100	20.0 ± 2.3	33.3 ± 1.0*	23.4 ± 1.4	12.0 ± 1.0*

Отличия достоверны от контроля при ^a $p < 0.05$; ^b $p < 0.01$ и облученного варианта (0 мкМ) – при ^c $p < 0.05$.

Таблица 2. Предимагинальная выживаемость особей (%) после воздействия гиперидина и хронического облучения при мощности 3,5 мГр/ч (накопленная доза за 10 дней составила 0.84 Гр).

Концентрация, мкМ	Линия			
	<i>Oregon-R</i>		<i>Sod^{Delta02/+}</i>	
	Контроль	Облучение	Контроль	Облучение
0	82.2 ± 6.4	93.8 ± 1.7	47.4 ± 2.7	76.3 ± 5.6**
1	86.4 ± 3.4	82.6 ± 3.5	61.6 ± 5.4 ^a	70.6 ± 7.7
10	74.3 ± 4.4	92.2 ± 2.0**	45.5 ± 3.9	55.4 ± 7.5 ^c
20	87.4 ± 3.8	91.3 ± 4.2	38.2 ± 1.6	86.5 ± 2.8**
100	84.2 ± 6.6	97.0 ± 1.0*	50.1 ± 3.1	66.6 ± 8.2*

Отличия достоверны от контроля при ^a $p < 0.05$; ** $p < 0.01$ и облученного варианта (0 мкМ) – при ^c $p < 0.05$.

Оцениваемый на основе коэффициента взаимодействия (K_w) биологический эффект совместного действия гиперидина и облучения носит преимущественно антогонистический характер как для частоты повреждений ДНК, так и для изменения предимагинальной выживаемости особей обеих линий дрозофилы практически для всех выбранных концентраций водорастворимой формы вещества (табл. 3). Для репродуктивного показателя антогонистический эффект наблюдали

лишь в одном варианте (при концентрации 20 мкМ) совместного действия факторов. Оказалось, в отличие от мутантного генотипа (*Sod^{Delta02/+}*) значительно меньшее влияние на плодовитость дрозофил линии *Oregon-R* оказывает гиперидин и эффект его взаимодействия с облучением. Это подтверждается результатами, свидетельствующими о том, что для всех концентраций, кроме 20 мкМ, значения K_w близки к единице. На частоту фрагментации ДНК достоверное влияние оказы-

вают оба фактора, при этом относительный вклад химического воздействия в их индукцию выше. В условиях совместного действия изучаемых агентов выход разрывов ДНК достоверно ниже уровня, индуцированного раздельным их действием.

Для некоторых изученных вариантов совместного действия факторов по показателям «плодовитости» и «выживаемости» может наблюдаться синергический тип взаимодействия указанных агентов. Для линии дикого типа *Oregon-R* достоверно значимый синергический эффект зарегистрирован при сочетанном влиянии облучения и гиперперидина только в концентрации 10 мкМ, и только по параметру предимагинальной выживаемости. Для мутантной линии *Sod^{Delta02}/+* высокие значения K_w ($p < 0,001$) обнаружены при комбинации радиационного воздействия и гиперперидина в следующих концентрациях: 10 и 100 мкМ – по репродуктивному показателю и 20 мкМ – по изменению выживаемости особей, находящихся на ранних стадиях онтогенеза. Следовательно, для достижения синергического эффекта необходимо одновременное увеличение времени воздействия обоих действующих агентов. Отметим, что к моменту анализа репродуктивной спо-

собности для облученных особей накопленная доза за 12 суток составила 1 Гр, при этом обработка гиперперидином длилась 6 дней. При оценке уровня предимагинальной выживаемости время экспозиции гиперперидина было таким же, как и при определении плодовитости, однако облучение проводили на протяжении 10 дней (накопленная доза 0,84 Гр). В цитогенетическом исследовании использовали особей, испытывающих химическое и радиационное воздействие в течение 5 дней, в этом случае накопленная доза составила 0,42 Гр, что примерно в два раза ниже накопленных доз облучения для вышеуказанных показателей. Считают [9, 11, 13], что основными механизмами формирования синергических эффектов при комбинированном действии химического и радиационного факторов являются: совместное взаимодействие повреждений ДНК и мембран; снижение эффективности работы восстановительных систем за счет химической модификации и конформационных преобразований биомолекул, участвующих в синтезе ферментов репарации; стимуляция митотической активности и сокращения времени для восстановления ДНК-нарушений.

Таблица 3. Значения коэффициентов взаимодействия при совместном действии гиперперидина и γ -излучения мощностью 3,5 мГр/ч.

Концентрация гиперперидина, мкМ	Коэффициент взаимодействия					
	Повреждения ДНК, усл. ед.		Репродуктивный показатель, кол-во эмбрионов/самку		Предимагинальная выживаемость, %	
	Линия <i>Oregon-R</i>	Линия <i>Sod^{Delta02}/+</i>	Линия <i>Oregon-R</i>	Линия <i>Sod^{Delta02}/+</i>	Линия <i>Oregon-R</i>	Линия <i>Sod^{Delta02}/+</i>
1	0.38**	-0.36**	1.05	1.01	0.02**	0.54**
10	0.24**	-0.45**	1.16	4.50**	2.70**	0.29**
20	0.35**	-0.58**	0.31**	0.61	0.54	1.98**
100	0.01	-0.14*	1.24	4.20	1.08	0.61

Нелинейные эффекты достоверны: * $p < 0.01$; ** $p < 0.001$.

Представленные в работе данные достаточно убедительно показывают, что в низких и медианных концентрациях гиперперидин обладает антиоксидантным действием в условиях длительного облучения. Возможно, указанный эффект связан с его способностью улавливать свободные радикалы и образовывать менее токсичные соединения в клетках с нарушенной антиоксидантной системой защиты.

Таким образом, результаты биологической активности гиперперидина при радиационном воздействии дрозофил показывают, что степень выраженности радиомодифицирующего эффекта препарата существенно зависит от его концентрации, временных характеристик влияния каждого из факторов и генетических особенностей организма. Изменение хотя бы одного из параметров может привести к значимому изменению ответной реакции животных. В основе наблюдаемых радиомодифицирующих свойств гиперперидина лежит его влияние на эффективность восстанови-

тельных систем клетки и развитие неспецифических реакций, индуцируемых облучением.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Уральского отделения РАН (№ 12-П-34-2009).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Евсеева Т.И.* Сочетанное действие факторов радиационной и нерадиационной природы на традиционную / Т.И. Евсеева, С.А. Гераськин. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. С. 45-53.
2. *Зайнуллин В.Г.* Современные аспекты радиобиологии *Drosophila melanogaster* / В.Г. Зайнуллин, М.В. Шапошников, А.А. Москалев, А.И. Таскаев. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 101 с.
3. *Левин В.Л.* Новые данные о детерминации клеток в развитии дрозофилы / В.Л. Левин, П.Я. Шварцман // Цитология. 1980. Т. 22, № 11. С. 1259-1283.
4. *Мосса И.Б.* Радиация и наследственность: Генетические аспекты противорадиационной защиты. Мн.: Университетское, 1990. С. 103–111.
5. *Юшкова Е.А.* Цитогенетические эффекты водорастворимой формы гиперперидина у дефицитных по антиоксидантной защите особей *Drosophila melanogaster* / Е.А.

- Юшкова, В.Г. Зайнуллин, В.В. Пунегов, Г.Г. Зайнуллин // Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. Т. 15, № 3 (1). С. 575-578.
6. Экологическая и космическая генетика. Селекция / [под ред. А.П. Акифьева, И.Ф. Жумилева]. Т. 3. М.: Наука, 2001. 437 с.
7. *Agostinis P.* Hypericin in cancer treatment: more light on the way / P. Agostinis, A. Vantieghem, W. Merlevede, P.A.de Witte // Int. J. Biochim. Cell Biol. 2002. Vol. 34, № 3. P. 221-241.
8. *Ashburner M.* Drosophila: A laboratory handbook. Cold. Spr. Harb. Lab. Press., 1989. 1331 p.
9. *Brekke O.-L.* Butylated hydroxyanisole inhibits tumor necrosis factor-induced cytotoxicity and arachidonic acid release / O.-L. Brekke, T. Espevik, K.S. Bjerve // Lipids. 1994. Vol. 29. P. 91-102.
10. Flybase / A database of Drosophila genes & genomes. Revision 3. [USA], 2003. URL: <http://flybase.bio.indiana.edu/>
11. *Kolman A.* Combined effects of r-radiation and ethylene oxide in human diploid fibroblast / A. Kolman, M. Chovanec // Mutagenesis. 2000. Vol. 12, № 2. P. 99-104.
12. *Mennini T.* The antidepressant mechanism of *Hypericum perforatum* / T. Mennini, M. Gobbi // Life Sci. 2004. Vol. 75, № 9. P. 1021-1027.
13. *Müller W.-U.* Time factors in combined exposures of mouse embryos to radiation and mercury / W.-U. Müller, C. Streffer // Radiat. Environmen. Biophys. 1988. Vol. 27, № 2 P. 115-121.
14. *Saddiqe Z.* A review of the antibacterial activity of *Hypericum perforatum* L. / Z. Saddiqe, I. Naeem, A. Maimoona // J. Ethnopharmacol. 2010. Vol. 131, № 3. P. 511-521.

THE EFFICIENCY SOLUBLE FORM OF HYPERICIN BY RADIATION INFLUENCE ON *DROSOPHILA MELANOGASTER*

© 2014 E.A. Yushkova^{1,2}, O.A. Startseva¹, L.K. Rocheva², V.G. Zainullin¹, V.V. Punegov¹, G.G. Zainullin³, I.S. Bodnar^{1,2}

¹Institute of Biology of Komi SC UB RAS, Syktyvkar

²Syktyvkar State University, Syktyvkar

³State Science and Research Institute, Pushchino

⁴Institute of Chemistry of Komi SC UB RAS, Syktyvkar

The biological activity and radiomodifying properties of the water-soluble form of hypericin for example *Drosophila melanogaster* were estimated. It is shown that the introduction in diet of test preparation of chronically irradiated (3,5 mGy/h) flies cause ambiguous of responses depending on the concentration of the substance, the temporal characteristics of the influence of each of the factors and genotypic characteristics of animals (at the level of fecundity, survival and the frequency of DNA damage). In the context of the joint effect of irradiation of hypericin and yield of DNA strand breaks in cells of both wild type *Oregon-R* (drug concentration at 10 and 100 µM) and lines *Sod^{Delta02} / +* (at concentrations not exceeding 100 µM) significantly below the level of the induced split their action. In terms of viability was observed only a few significant changes in response to the interaction of the agents studied. These data suggest that hypericin has an antioxidant effect in cells of irradiated individuals with impairments in the production of Mn-containing superoxide dismutase.

Key words: drosophila, ionizing radiation, water-soluble form of hypericin, level of DNA breaks, survival, antioxidant protection, mitochondrial superoxide dismutase (MnSod)

Yushkova Elena Alexandrovna, Candidate of Biology, ushkova@ib.komisc.ru; *Startseva Olga Alexandrovna*, draduate student, startseva@ib.komisc.ru; *Zainullin Vladimir Gabdullovich*, Doctor of Biology, Professor, vzainullin@ib.komisc.ru; *Rocheva Liliya Kirillovna*, bachelor, LiliyaRocheva@gmail.com; *Punegov Vasiliy Vitalievich*, Candidate of Chemistry, punegov@ib.komisc.ru; *Zainullin Gennadij Gabdullovich*, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, zainullin@chemi.komisc.ru; *Bodnar Irina Sergeevna*, Candidate of Biology, bodnar-irina@mail.ru