

© 2008 С.В. Саксонов, Н.В. Конева, С.А. Сенатор\*

## РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЕРСОНИФИКАЦИЯ НАХОДОК CYPERACEAE И CARYOPHYLLACEAE s.l.

Представлены итоги по персонификации флористических находок в семействах Cyperaceae и Caryophyllaceae Самарской области.

**Саксонов С.В., Конева Н.В., Сенатор С.А.**

### РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЕРСОНИФИКАЦИЯ НАХОДОК CYPERACEAE И CARYOPHYLLACEAE s.l.

On the base of critical researching of literature beginnings was doing personification of floristic new types of plants at the Cyperaceae & Caryophyllaceae.

Отсутствие списка флоры Самарской области сдерживает изучение растительного покрова этого интереснейшего в ботанико-географическом отношении региона. В целях инвентаризации флористического разнообразия области нами предпринята работа по персонификации флористических находок в одном из крупнейших семейств – Cyperaceae и Caryophyllaceae, итоги которой представлены ниже.

### CYPERACEAE

1.1. *Blismus compressus* (L.) Panz. ex Link – Татанов, 2006 :124 (Самарская область) [Егорова, 1976, 2 : 98].

2.2. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla (*Scirpus maritimus* L.) – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 92; Плаксина, 2001 : 85; Саксонов, 2005 : 314; Саксонов, Конева, 2005 : 191; Татанов, 2006 : 123].

2.3. *Bolboschoenus laticarpus* Marchold. et all. (*B. yagara* (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan x *B. planiculis* (Fr. Schmidt) Egor) – Соловьева, Саксонов, 2006 : 189, 25.08.2005, г. Самара, пруды Безымянской ТЭЦ [Татанов, 2006 : 123 – для Самарской области не указан].

2.4. *Bolboschoenus kozhevnikovii* (Litv.) A.E. Kochevnikov – Соловьева, Саксонов, 2005 : 189 (техногенные водоемы самарского Заволжья).

3.5. *Carex acuta* L. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [ФВЕ, 2 : 198; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, 2005 : 315; Саксонов, Конева, 2005 : 191; Татанов, 2006 : 134].

3.6. *Carex acutiformis* Ehrh. (*C. paludosa* Good.) – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 166; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001

---

\* Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти.

: 87; Саксонов, 2005 : 315; Саксонов, Конева, 2005 : 191; Татанов, 2006 : 139].

3.7. *Carex appropinquata* Schum. (*C. paradoxa* Willd.) – Клаус, 1852: 151 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 204; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, Конева, 2005 : 191; Татанов, 2006 : 131].

3.8. *Carex aquatilis* Wahl. – Смирнов, <1904> (Муранский бор), цит. по Кривошеева, 1961 : 34 [Егорова, 1976, 2 : 200; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, 2005 : 315; Саксонов, Конева, 2005 : 191; Татанов, 2006 : 134].

3.9. *Carex arnellii* Christ – Бакунин, <?> (окр. Самары), цит. по Литвинов, 1927, 2 : 306 [Егорова, 1976, 2 : 171; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, 2005 : 316; Саксонов, Конева, 2005 : 191; Татанов, 2006 : 141].

3.10. *Carex aspratilis* V. Krecz. – Гончарова, 27.06.1937, (Жигули), цит. по Саксонов, 2005 : 316 [Егорова, 1976, 2 : 177; Кривошеева, 1961 : 34; Саксонов, 2005 : 316; Саксонов, Конева, 2005 : 191].

3.11. *Carex atheroides* Spreng. (*C. aristata* R. Br., *C. orthostachys* C. A. Mey.) – Клаус <1852> (Сергиевск), цит. по Коржинский, 1898 : 452 [Егорова, 1976, 2 : 164; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, 2005 : 316; Саксонов, Конева, 2005 : 192; Татанов, 2006 : 135].

3.12. *Carex bohémica* Schreb. – Кривошеева, <1961> (Безенчукский р-н, окр. с. Нижняя Сызрань), цит. по Матвеев, Устинова, 1988 : 91 [Егорова, 1976, 2 : 213; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, Конева, 2005 : 192; Татанов, 2006 : 130].

3.13. *Carex brunnescens* (Pers.) Poir – Саксонов, Конева, 2005 : 192 (Сызранский р-н, Рачейский бор) [Егорова, 1976, 2 : 217; Татанов, 2006 : 133 – для Самарской области не указан]

3.14. *Carex buxbaumii* Wahl. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 195; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, Конева, 2005 : 192; Татанов, 2006 : 134].

3.15. *Carex caespitosa* L. – Клаус <1852> (Сергиевск), цит. по Коржинский, 1898 : 450 [Егорова, 1976, 2 : 202; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, 2005 : 316; Саксонов, Конева, 2005 : 192; Татанов, 2006 : 134].

3.16. *Carex canescens* L (*C. cinerea* Poll. – Коржинский, 1898 : 440 [Егорова, 1976, 2 : 215; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, 2005 : 317; Саксонов, Конева, 2005 : 192; Татанов, 2006 : 133].

3.17. *Carex capillaris* L. (*C. chlorostachys* Stev.) – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 191; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, Конева, 2005 : 192; Татанов, 2006 : 141 – для Самарской области не указан].

3.18. *Carex caryophyllea* Latourg. – Клаус, <1852> (Сергиевск), цит. по Литвинов, 2 : 303 [Егорова, 1976, 2 : 183; Кривошеева, 1961 : 38; Плаксина, 2001 : 87; Саксонов, 2005 : 317; Саксонов, Конева, 2005 : 192; Татанов, 2006 : 136].

3.19. *Carex chordorrhiza* Ehrh. – Татанов, 2006 : 129 (Самарская область) [Егорова, 1976, 2 : 210].

3.20. *Carex colchica* J. Gay – Смирнов, 03.06.1935, Жигулевский заповедник, остров Середыш, цит. по Саксонов, 2005 : 317 [Егорова, 1976, 2 : 208; Кривошеева, 1961 : 34; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, 2005 : 317; Саксонов, Конева, 2005 : 193; Татанов, 2006 : 129].

3.21. *Carex contigua* Норре – Пабо <1852> (Сергиевск) цит. по Литвинов, 3: 292 [Егорова, 1976, 2 : 207; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, 2005 : 317; Саксонов, Конева, 2005 : 193; Татанов, 2006 : 131].

3.22. *Carex diandra* Schrank (*C. teretiuscula* Good.) – Клаус, 1852: 151 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 204; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, Конева, 2005 : 193; Татанов, 2006 : 130].

3.23. *Carex digitata* L. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 182; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, 2005 : 317; Саксонов, Конева, 2005 : 193; Татанов, 2006 : 137].

3.24. *Carex diluta* Vieb. (*C. karelinii* Meensch.) – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 177; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, 2005 : 318; Саксонов, Конева, 2005 : 193; Татанов, 2006 : 141].

3.25. *Carex dioica* L. (*C. davalliana* Smith) – Клаус, 1852: 151 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 214; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, Конева, 2005 : 193; Татанов, 2006 : 128].

3.26. *Carex distans* L. – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 177; Кривошеева, 1961 : 35; Татанов, 2006 : 140].

3.27. *Carex disticha* Huds. (*C. intermedia* Cood.) – Клаус <1852> (Сергиевск), цит. по: Коржинский, с. 437 [Егорова, 1976, 2 : 207; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, Конева, 2005 : 193; Татанов, 2006 : 133].

3.28. *Carex echinata* Murr. – Пабо, <1852> (Сергиевск), цит. по Литвинов, 2 : 292 [Егорова, 1976, 2 : 213; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, 2005 : 318; Саксонов, Конева, 2005 : 194; Татанов, 2006 : 132].

3.29. *Carex elata* All. (*C. stricta* Good.) – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 201 (для Заволжья не указан; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, Конева, 2005 : 194)].

3.30. *Carex elongata* L. – Гончарова, Золотовский, <1941> (Жигулевский заповедник) [Егорова, 1976, 2 : 215; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, 2005 : 318; Саксонов, Конева, 2005 : 194; Татанов, 2006 : 132].

3.31. *Carex ericetorum* Poll. – Коржинский, 1898 : 447 (Мулловка, со ссылкой на Эдера) [Егорова, 1976, 2 : 186; Кривошеева, 1961 : 35; Плаксина, 2001 : 88; Саксонов, 2005 : 318; Саксонов, Конева, 2005 : 194; Татанов, 2006 : 136].

- 3.32. *Carex flava* L. – Пабо, <1852> (Серигевск), цит. по Кривошеева, 1961 : 36). [Егорова, 1976, 2 : 178; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, Конева, 2005 : 194; Татанов, 2006 : 140].
- 3.33. *Carex globularis* L. – Татанов, 2006 : 135 (Самарская область) [Егорова, 1976, 2 : 186].
- 3.34. *Carex hartmanii* Cajand. – Кривошеева, 1964 : 35 (Волжский р-н, с. Шелехметь) [Егорова, 1976, 2 : 195; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, 2005 : 319; Саксонов, Конева, 2005 : 194; Татанов, 2006 : 134].
- 3.35. *Carex hirta* L. – Кривошеева, 1961 : 36 (близ с. Курумоч и в пойме р. Курумоч) [Егорова, 1976, 2 : 164; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, Конева, 2005 : 194; Татанов, 2006 : 135].
- 3.36. *Carex humilis* Leyss. – Аболин, <1911> (Жигули), цит. по Литвинов, 2 : 303 [Егорова, 1976, 2 : 183; Кривошеева, 1961 : 36; Саксонов, 2005 : 319; Саксонов, Конева, 2005 : 195; Татанов, 2006 : 136].
- 3.37. *Carex juncella* (Fries) Th. Fries (*C. wiluica* Meinch.) – Кривошеева, 1962 : 38 (Борский р-н, Бузулукский бор) [Егорова, 1976, 2 : 201; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, Конева, 2005 : 195; Татанов, 2006 : 134].
- 3.38. *Carex lasiocarpa* Ehrh. – Литвинов, 2 : 315 (близ г. Самары) [Егорова, 1976, 2 : 166; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, 2005 : 319; Саксонов, Конева, 2005 : 195; Татанов, 2006 : 136].
- 3.39. *Carex leporina* L. – Коржинский, 1898 : 439 (Сытовка, Подгоры) [Егорова, 1976, 2 : 213; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, 2005 : 319; Саксонов, Конева, 2005 : 195; Татанов, 2006 : 132].
- 3.40. *Carex limosa* L. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 192; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, Конева, 2005 : 195; Татанов, 2006 : 138].
- 3.41. *Carex macroura* Meinsch. (*C. pediformis* C. A. Mey. subsp. *macroura* (Meinsch.) Podp.) – Гончарова, Золотовский, <1941> (Жигулевский заповедник), цит. по Саксонов, 2005 : 319 [Егорова, 1976, 2 : 183; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, Конева, 2005 : 195; Татанов, 2006 : 135 – для Самарской области не указан].
- 3.42. *Carex melanostachya* Vieb. ex Willd. (*C. nutans* Host) – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 166; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, 2005 : 320; Саксонов, Конева, 2005 : 195; Татанов, 2006 : 139].
- 3.43. *Carex michelii* Host – Саксонов, Конева, 2005 : 195 (Шигонский р-н, Новодевичьи горы) [Егорова, 1976, 2 : 166; Татанов, 2006 : 136 – для Самарской области не указан].
- 3.44. *Carex montana* L. – Везенмейер <1854>, цит. по Литвинов, 2 : 302 [Егорова, 1976, 2 : 186 – не указан для Волго-Донского флористического подрайона; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, 2005 : 320; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 135 – для Самарской области не указан].

3.45. *Carex muricata* L. – Клаус, 1852: 151 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 207; Кривошеева, 1961 : 36; Плаксина, 2001 : 89; Саксонов, 2005 : 320; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 132].

3.46. *Carex nigra* (L.) Reichard (*C. vulgaris* Fries) – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 198; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 320; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 134].

3.47. *Carex omskiana* Meinsh. (*C. aquatilis* Wahl. subsp. *omskiana* (Meinsh.) Jalae) – Кривошеева, 1961 : 37 (Волжский р-н, близ с. Шелехметь) [Егорова, 1976, 2 : 198; Саксонов, 2005 : 321; Татанов, 2006 : 133].

3.48. *Carex otrubae* Podr. – Плаксина, 2001 : 90 (Шенталинский р-н, леса в окр. с. Шентала) [Егорова, 1976, 2 : 206; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 131 – для Самарской области не указан].

3.49. *Carex pallescens* L. – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 180; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 321; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 140].

3.50. *Carex ranicea* L. – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 174; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 138 – для Самарской области не указан].

3.51. *Carex pediformis* С. А. Меу. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 182; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 321; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 137 – для Самарской области не указан].

3.52. *Carex pilosa* Scop. – Клаус, 1852: 153 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 173; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 321; Саксонов, Конева, 2005 : 196; Татанов, 2006 : 137].

3.53. *Carex polyphylla* Kar. et Kir. – Гончарова, Золотовский, <1941> (Жигулевский заповедник) [Егорова, 1976, 2 : 206; Саксонов, 2005 : 322; Саксонов, Конева, 2005 : 197; Татанов, 2006 : 132].

3.54. *Carex praecox* Schreb. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 208; Саксонов, 2005 : 322].

3.55. *Carex praecox* Schreb. (*C. schreberi* Schrank.) – Клаус, 1852: 151 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 208; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, Конева, 2005 : 197; Татанов, 2006 : 129].

3.56. *Carex pseudocyperus* L. – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 166; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 322; Саксонов, Конева, 2005 : 197; Татанов, 2006 : 141].

3.57. *Carex rhizina* Blytt ex Lindblom – Пабо, <1852> (Сергиевск), цит. по Литвинов, 2 : 304 [Егорова, 1976, 2 : 183; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 322; Саксонов, Конева, 2005 : 197; Татанов, 2006 : 135].

3.58. *Carex rhynchophysa* С. А. Меу – Саксонов, Конева, 2005 : 197 (Шенталинский р-н, окр. с. Шентала) [Егорова, 1976, 2 : 167; Плаксина, 2001 : 90; Татанов, 2006 : 139 – для Самарской области не указан].

3.59. *Carex riparia* Gurt. – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 164; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 323; Саксонов, Конева, 2005 : 197; Татанов, 2006 : 139].

3.60. *Carex rostrata* Stokes (*C. ampullaceal* Good.) – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 167; Кривошеева, 1961 : 38; Плаксина, 2001 : 90; Саксонов, 2005 : 322; Саксонов, Конева, 2005 : 197; Татанов, 2006 : 139].

3.61. *Carex secalina* Wahl. Крылов, <ок. 1870> (Самара, Сороки), цит. по Литвинов, 2 : 310 [Егорова, 1976, 2 : 175; Плаксина, 2001 : 91; Саксонов, Конева, 2005 : 198; Татанов, 2006 : 140 – для Самарской области не указан].

3.62. *Carex serotina* Mérat (*C. oederi* Retz.) – Пабо, <1852>, (Сергиевск), цит. по Литвинов, 2: 208 [Егорова, 1976, 2 : 179].

3.63. *Carex stenophylla* Wahl. – Клаус, 1852: 151 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 210; Кривошеева, 1961 : 38; Плаксина, 2001 : 91; Саксонов, Конева, 2005 : 198; Татанов, 2006 : 130].

3.64. *Carex supina* Wahl. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 188; Кривошеева, 1961 : 38; Плаксина, 2001 : 91; Саксонов, 2005 : 322; Саксонов, Конева, 2005 : 198; Татанов, 2006 : 138].

3.65. *Carex sylvatica* Huds. – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 171; Кривошеева, 1961 : 38; Плаксина, 2001 : 91; Саксонов, 2005 : 323; Саксонов, Конева, 2005 : 198; Татанов, 2006 : 141].

3.66. *Carex tomentosa* L. – Клаус, 1852: 152 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 187; Кривошеева, 1961 : 37; Плаксина, 2001 : 91; Саксонов, Конева, 2005 : 198; Татанов, 2006 : 135 – для Самарской области не указан].

3.67. *Carex vaginata* Tausch – Саксонов, Конева, 2005 : 198 (Сызранский р-н, Рачейский бор) [Егорова, 1976, 2 : 174; Плаксина, 2001 : 91; Татанов, 2006 : 138]

3.68. *Carex vesicaria* L. – Клаус, 1852: 154 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 168; Кривошеева, 1961 : 38; Плаксина, 2001 : 91; Саксонов, 2005 : 324; Татанов, 2006 : 139].

3.69. *Carex vulpina* L. – Клаус, 1852: 151 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 206; Кривошеева, 1961 : 38; Плаксина, 2001 : 91; Саксонов, 2005 : 324; Татанов, 2006 : 131].

4.70. *Cladium mariscus* (L.) Pohl (*C. germanicum* Schradr.) – Клаус, 1852: 149 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 128; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, Конева, 2005 : 199; Татанов, 2006 : 127].

5.71. *Scyperus fuscus* L. – Клаус, 1852: 149 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 124 – вид не указан Для Волжско-Донского и Заволжского флористических подрайонов; Плаксина, 2001 : 84; Саксонов, 2005 : 324; Саксонов, Конева, 2005 : 199; Татанов, 2006 : 127].

5.72. *Scyperus glaber* L. – Матвеев, 1969 : 3 (Рождественно) [Егорова, 1976, 2 : 123; Плаксина, 2001 : 84; Саксонов, 2005 : 325; Саксонов, Конева, 2005 : 199].

6.73. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 110; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, 2005 : 325; Саксонов, Конева, 2005 : 199; Татанов, 2006 : 125].

6.74. *Eleocharis austriaca* Hayek (*E. mamillata* Lindb. fil. subsp. *austriaca* (Hayek) Strandhede) – Саксонов, Конева, 2005 : 199 (Шигонский р-н, Муранский бор) [Егорова, 1976, 2 : 113; Татанов, 2006 : 126 – для Самарской области не указан]

6.75. *Eleocharis klingei* (Meensch.) V. Fedtsch. – Коржинский, <1898> (Самарская губерния и уезды), цит. по Цинзерлинг, 1927, 2 : 278 [Егорова, 1976, 2 : 117; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, Конева, 2005 : 199; Татанов, 2006 : 126].

6.76. *Eleocharis mamillata* Lindb. fil – Гончарова, Золотовский, <1941> (Жигулевский заповедник) [Егорова, 1976, 2 : 112; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, 2005 : 325; Саксонов, Конева, 2005 : 199; Татанов, 2006 : 126].

6.77. *Eleocharis ovata* (Roth) Roem. et Schult. – Малиновская, Плаксина, <2000> (Самарская Лука, окр. Соснового Солонца) [Егорова, 1976, 2 : 112; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, 2005 : 325; Саксонов, Конева, 2005 : 200; Татанов, 2006 : 125 – для Самарской области не указан].

6.78. *Eleocharis oxylepis* (Meensch.) V. Fedtsch. – Софинский, 21.05.1904, окр. с. Августовка, цит. по Цинзерлинг, 1927, 2 : 278 [Егорова, 1976, 2 : 118; Саксонов, Конева, 2005 : 200; Татанов, 2006 : 126].

6.79. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult. – Клаус, 1852: 149 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 113; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, 2005 : 325; Саксонов, Конева, 2005 : 200; Татанов, 2006 : 126].

6.80. *Eleocharis quinqueflora* (Hartm.) O. Schwarz (*Scirpus baeotryon* Ehrh., *S. pauciflorus* Lightf.) – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 109; Саксонов, Конева, 2005 : 200; Татанов, 2006 : 125 – для Самарской области не указан; Плаксина, 2001 : 86].

2.81. *Eleocharis uniglumis* (Link.) Schult. – Клаус, 1852: 149 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 115; Саксонов, 2005 : 326; Плаксина, 2001 : 86;; Татанов, 2006 : 126].

7.82. *Eriophorum gracile* Koch – Смирнов, 1904 : 14 (Самарская Лука, Клюквенное болото) [Егорова, 1976, 2 : 101; Плаксина, 2001 : 84; Саксонов, 2005 : 326; Саксонов, Конева, 2005 : 200; Татанов, 2006 : 125].

7.83. *Eriophorum latifolium* Норре – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 101; Плаксина, 2001 : 84; Саксонов, Конева, 2005 : 200; Татанов, 2006 : 125].

7.84. *Eriophorum polystachion* L. (*E. angustifolium* Richt. K) – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 101; Плаксина, 2001 : 84; Саксонов, 2005 : 326; Саксонов, Конева, 2005 : 200].

7.85. *Eriophorum vaginatum* L. – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 103; Плаксина, 2001 : 84; Саксонов, Конева, 2005 : 201; Татанов, 2006 : 125].

8.86. *Русреус flavescens* (L.) Reichb. (*Cyperus flavescens* L.) – Клаус, 1852 : 149 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 125; Плаксина, 2001 : 84;

Саксонов, Конева, 2005 : 201; Татанов, 2006 : 127 – для Самарской области не указан].

9.87. *Rynchospora alba* (L.) Vahl – Клаус, 1852: 149 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 132; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, Конева, 2005 : 201; Татанов, 2006 : 128].

10.88. *Schoenoplectus lacustris* L. (Palla) (*Scirpus lacustris* L.) – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 91; Плаксина, 2001 : 84; Саксонов, 2005 : 327; Саксонов, Конева, 2005 : 201; Татанов, 2006 : 124].

10.89. *Schoenoplectus melanospermus* (C. A. Mey.) Grossh. – Татанов, 2006 : 123 (Самарская область) [Егорова, 1976, 2 : 92 – в Заволжье указан лишь для Саратовской области].

10.90. *Schoenoplectus supinus* (L.) Palla (*Scirpus supinus* L.) – Саксонов, 31.08.1986 (окр. с. Торное) [Егорова, 1976, 2 : 93 – вид не указан для Волго-Донского флористического подрайона; Плаксина, 2001 : 85; Саксонов, 2005 : 327; Саксонов, Конева, 2005 : 201; Татанов, 2006 : 123 – для Самарской области не указан].

10.91. *Schoenoplectus tabernaemontani* C. C. Gmel (*Scirpus tabernaemontani* (C. C. Gmel.) Palla) – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 92; Плаксина, 2001 : 85; Саксонов, 2005 : 327; Саксонов, Конева, 2005 : 201; Татанов, 2006 : 124].

10.92. *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla (*Scirpus triqueter* L.) – Саксонов, 2005 : 327 (долина Волги, остров Сосновый) [Егорова, 1976, 2 : 92; Плаксина, 2001 : 85; Саксонов, 2005 : 327; Саксонов, Конева, 2005 : 201].

11.93. *Schoenus ferrugineus* L. (*Chaetospora ferruginea* R. Br.) – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 131; Плаксина, 2001 : 86; Саксонов, Конева, 2005 : 201; Татанов, 2006 : 128].

12.94. *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják (*Holoschoenus vulgaris* Link) – Смирнов, <1904> (Жигули), цит. по Литвинов, 1927 : 271 [Егорова, 1976, 2 : 96; Плаксина, 2001 : 85; Саксонов, 2005 : 326; Саксонов, Конева, 2005 : 202; Татанов, 2006 : 124].

13.95. *Scirpus radicans* Schkuhr Саксонов, Конева, 2005 : 202 (Сызранский р-н, Рачейский бор) [Егорова, 1976, 2 : 89; Плаксина, 2001 : 85; Татанов, 2006 : 122].

13.96. *Scirpus sylvaticus* L. – Клаус, 1852: 150 (Сергиевск) [Егорова, 1976, 2 : 89; Плаксина, 2001 : 85; Саксонов, 2005 : 327; Саксонов, Конева, 2005 : 202; Татанов, 2006 : 122].

14.97. *Trichophorum pumilum* (Vahl) Schinz et Thell. (*Baeothryon pumilum* (Vahl) A. et D. Löve – Егорова, 1976, 2 : 105 (Самарская область, окр. Сергиевска) [Татанов, 2006 : 125].

Первые сведения о представителях Сурегасеае содержатся в уникальной работе К.К. Клауса (1852), который подробно изучил флору окрестностей Сергиевска. Подавляющее число флористических находок сделано именно им и доктором медицины из Оренбурга Климентом Адольфовичем Пабо (06.01.1830 – 23.01.1890). Жизнь и творчество этого

талантливого коллектора нам неизвестна, однако во «Флоре Юго-Востока», изданной главным ботаническим садом в 1927-1930 гг., имеется огромное количество ссылок на этого исследователя.

С.И. Коржинский, автор фундаментальной сводки о растениях Восточной России (1898), повторил практически все находки Cyperaceae, сделанные К.К. Клаусом и пополнил его список 4 видами (*Carex canescens*, *C. ericetorum*, *C. leporina* и *Eleocharis klingei*)

Очередной обзор Cyperaceae сделал известный ботанико-географ Д.И. Литвинов (1927), подтвердивший факты произрастания в области многих видов этого семейства и нашедший редкий вид *Carex lasiocarpa*.

Опытнейшему коллектору Д.М. Софинскому в начале XX века удалось найти редчайший вид – *Eleocharis oxylepis*. Р.И. Аболину, изучавшему растительность Жигулей в 1909 г., принадлежит находка *Carex humilis*. Вал.И. Смирнов в 1903 г. во время изучения флоры Самарской Луки сделал находки *Eriophorum gracile* и *Scirpoides holoschoenus*. Вас.И. Смирнов, сотрудник Жигулевского заповедника, в середине 30-ых гг. пополнил список семейства двумя видами – *Carex aquatilis* и *C. colchica*. Ряд интереснейших находок в конце 30-ых гг. прошлого века на территории Жигулевского заповедника сделаны А.Н. Гончаровой и М.В. Золотовским – *Carex aspratilis*, *C. elongata*, *C. macroura*, *C. polyphylla* и *Eleocharis mamillata*.

Обстоятельная ревизия рода *Carex* сделана М.Г. Кривошеевой (1961). Среди ее находок, такие редкие виды как *Carex bohémica*, *C. hartmanii*, *C. hirta*, *C. juncella* и *C. omskiana*. В.И. Матвеев, известный специалист по прибрежно-водной флоре и растительности, нашел *Cyperus glaber*. Виднейший знаток Cyperaceae Т.В. Егорова, указывает для области редчайший вид *Trichophorum pumilum*. Т.И. Плаксиной принадлежит находка *Carex otrubae*, а также, совместно с Е.И. Малиновской, – *Eleocharis ovata*. С.В. Саксонов пополнил список еще двумя видами – *Schoenoplectus supinus* и *Schoenoplectus triqueter*. Совместно с В.В. Соловьевой найдены *Bolboschoenus laticarpus* и *Bolboschoenus kozhevnikovii*, а вместе с Н.В. Коневой – *Carex brunescens*, *C. michelii*, *C. rhyngophysa*, *C. vaginata*, *Eleocharis austriaca* и *Scirpus radicans*.

Последние указания о произрастании ряда видов на территории Самарской области сделаны И.В. Татановым (2006) – *Blismus compressus*, *Carex chordorrhiza*, *C. globularis* и *Schenoplectus melanospermus*.

## CARYOPHYLLACEAE

1.1. *Agrostemma githago* L. (*A. linicola* Terech.; *Githago segetum* Desf.) – Клаус, 1852 : 73 [Крупкина, 2004, 11 : 213; Терехов, 1969 : 350; Плаксина, 2001 : 122; Саксонов, 2005 : 150; Майоров, 2006 : 224].

2.2. *Alsine medium* L. (*Stellaria media* Vill.) – Клаус, 1852 : 74 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 155; Терехов, 1969 : 341; Плаксина, 2001 : 119; Саксонов, 2005 : 162; Майоров, 2006 : 219].

3.3. *Arenaria serpyllifolia* L. – Клаус, 1852 : 73 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 185 Терехов, 1969 : 343; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 150; Еленевский, Куранова, 2006 : 222].

3.4. *Arenaria visicida* Hall. fil. ex Lois (*A. serpyllifolia* L. subsp. *glutinosa* (Merat. et Koch) Arcang.; *A. leptoclados* (Reichenb.) Guss. subsp. *viscidula* Dvorak) – Саксонов, 2005 : 150 (Жигулевский заповедник, под ошибочным названием *A. leptoclados*) [Цвелев, 2004, 11 : 186].

4.5. *Carpophora viscosa* (L.) Tzvel. (*Melandrium viscosum* (L.) Celak.; *Silene viscosa* Pers.) – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 225; Терехов, 1969 : 348; Плаксина, 2001 : 123; Саксонов, 2005 : 150; Майоров, 2006 : 224].

5.6. *Cerastium holostoides* Fries (*C. fontanum* Baumg.) – Клаус, 1852 : 74 (Сергиевск) [Соколова, 2004, 11 : 162; Терехов, 1969 : 345; Плаксина, 2001 : 120; Саксонов, 2005 : 151; Майоров, 2006 : 220].

6.7. *Cerastium triviale* Link (*C. holisteoides* Fries subsp. *triviale* (Link) Moschl.; *C. holisteoides* Fries subsp. *glandulosum* (Boenn.) I.V. Sokolova) – Клаус, 1852 : 74 (Сергиевск) [Соколова, 2004, 11 : 163].

6.8. *Cerastium zhigulense* Saksonov – Саксонов, 1990 : 1168 (Жигулевский заповедник) [Соколова, 2004, 11 : 166; Плаксина, 2001 : 120; Саксонов, 2005 : 151; Майоров, 2006 : 220 – синонимизирнуты с *C. arvense* L.].

7.9. *Coscyganthe flos-cuculi* (L.) Fourr. (*Coronaria flos-cuculi* (L.) A. Br.; *Lychnis flos-cuculi* L.) – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Крупкина, 2004, 11 : 209; Терехов, 1969 : 346; Плаксина, 2001 : 124; Саксонов, 2005 : 151; Новиков, 2006 : 225].

8.10. *Cucubalus baccifer* L. – Клаус, 1852 : 73 (Сергиевск) [Крупкина, 2004, 11 : 229; Терехов, 1969 : 350; Плаксина, 2001 : 124; Саксонов, 2005 : 151; Майоров, 2006 : 224].

9.11. *Dianthus acicularis* Fisch. ex Ledeb. – Смирнов <1904> (Жигули), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 307 [Кузьмина, 2004, 11 : 295; Плаксина, 2001 : 125; Саксонов, 2005 : 152; Еленевский, Куранова, 2006 : 231].

9.12. *Dianthus andrzejowskiana* (Zapl.) Kulcz. (*D. capitatus* Walb.) – Клаус, 1852 : 70 (Сергиевск) [Кузьмина, 2004, 11 : 291; Плаксина, 2001 : 125; Саксонов, 2005 : 152; Еленевский, Куранова, 2006 : 230].

9.13. *Dianthus borbasii* Vand. – Коржинский, 1898 : 58 (без точного указания на место произрастания) [Кузьмина, 2004, 11 : 288; Плаксина, 2001 : 126; Саксонов, 2005 : 152; Еленевский, Куранова, 2006 : 230].

9.14. *Dianthus borbatus* L. – Плаксина, 1982 : 75 (Жигулевский заповедник) [Кузьмина, 2004, 11 : 281; Плаксина, 2001 : 125 Еленевский, Куранова, 2006 : 230].

9.15. *Dianthus campestris* Vieb. – Клаус, 1852 : 70 (Сергиевск) [Кузьмина, 2004, 11 : 284; Терехов, 1969 : 351; Плаксина, 2001 : 126; Саксонов, 2005 : 152; Еленевский, Куранова, 2006 : 231].

9.16. *Dianthus capitatus* Walb. ex DC. – Клаус, 1852 : 70 (Сергиевск) [Кузьмина, 2004, 11 : 291].

9.17. *Dianthus deltoids* L. – Паллас, <1769> (Самарский уезд), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 311. [Кузьмина, 2004, 11 : 284; Терехов, 1969 : 351; Плаксина, 2001 : 126; Саксонов, 2005 : 153; Еленевский, Куранова, 2006 : 231].

9.18. *Dianthus leptopetalus* Willd. – Горелов и др., 1977 : 1331 (Пестравский р-н, окр. с. Телешовки) [Плаксина, 2001 : 126; Кузьмина, 2004, 11 : 292].

9.19. *Dianthus polymorphus* Vieb. – Клаус, 1852 : 70 [Плаксина, 2001 : 126; Саксонов, 2005 : 153].

9.20. *Dianthus pratensis* Vieb. (*D. seguieri* auct.) – Коржинский, 1898 : 59 (Сергиевск, Кинель-Черкассы, Самара) [Кузьмина, 2004, 11 : 281; Терехов, 1969 : 351; Плаксина, 2001 : 126; Саксонов, 2005 : 153; Еленевский, Куранова, 2006 : 231].

9.21. *Dianthus rigidus* Vieb. – Саксонов и др., 2006 : 89 (Сызранский р-н, Кашпир) [Плаксина, 2001 : 126; Кузьмина, 2004, 11 : 286].

9.22. *Dianthus squarrosus* Vieb. – Плаксина, 2001 : 126 (без точного указания на место произрастания) [Кузьмина, 2004, 11 : 295; Плаксина, 2001 : 126; Еленевский, Куранова, 2006 : 232].

9.23. *Dianthus stenocalyx* Juz. Шишкин, 1941 : 352 (без точного указания на место произрастание) (*D. superbus* Vieb. [Кузьмина, 2004, 11 : 294; Саксонов, 2005 : 153; Плаксина, 2001 : 126; Еленевский, Куранова, 2006 : 231 – синонимизирован с *D. superbus*].

9.24. *Dianthus versicolor* Fisch. ex Link. – Плаксина, 1982 : 75 (Жигулевский заповедник) [Кузьмина, 2004, 11 : 282; Плаксина, 2001 : 127; Саксонов, 2005 : 153].

9.25. *Dianthus volgicus* Juz. – Юзепчук, 1950 : 73 (Сызранский р-н, Муранский бор) [Плаксина, 2001 : 127; Саксонов, 2005 : 154; Еленевский, Куранова, 2006 : 231 – синонимизуруется с *D. squarrosus* Vieb.].

10.26. *Elysanthe noctiflora* (L.) Willk. (*Melandrium noctiflorum* (L.) Fries; *Silene noctiflora* L.) – Клаус, 1852 : 72 [Цвелев, 2004, 11 : 224; Терехов, 1969 : 347; Плаксина, 2001 : 123; Саксонов, 2005 : 154; Майоров, 2006 : 224].

11.27. *Eremogone biebersteinii* (Schlecht.) Holub (*Arenaria graminifolia* Schrad.) – Клаус, 1852 : 73 (Сергиевск) [Иконников, 2004, 11 : 180; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 154; Еленевский, Куранова, 2006 : 222].

11.28. *Eremogone koriniana* (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. (*Arenaria koriniana* Fisch.) – Пабо, <1852> (Сергиевск), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 266 [Иконников, 2004, 11 : 178; Терехов, 1969 : 343; Плаксина, 2001 : 120; Еленевский, Куранова, 2006 : 222].

11.29. *Eremogone longifolia* (Vieb.) Fenzl (*Arenaria longifolia* Vieb.) – Клаус, 1852 : 73 (Сергиевск) [Иконников, 2004, 11 : 178; Терехов, 1969 : 343; Плаксина, 2001 : 120; Еленевский, Куранова, 2006 : 222].

11.30. *Eremogone micradenia* (P. Smorn.) Ikonn. (*Arenaria graminifolia* Schrad.) – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Иконников, 2004, 11 : 179; Терехов,

1969 : 343; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 155; Еленевский, Куранова, 2006 : 222].

11.31. *Eremogone saxatilis* (L.) Иконн. – Черепнин, <1941> (Жигулевский заповедник), цит. по Саксонов, 2005 6 155 [Иконников, 2004, 11 : 179; Терехов, 1969 : 343; Саксонов, 2005 : 155; Еленевский, Куранова, 2006 : 222].

12.32. *Gypsophila altissima* L. – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Иконников, 2004, 11 : 260; Терехов, 1969 : 346; Плаксина, 2001 : 124; Саксонов, 2005 : 155; Майоров, 2006 : 229].

12.33. *Gypsophila fastigiata* L. – Плаксина, 2001 : 124 (Сенгилеевская возвышенность, со ссылкой на гербарий Московского университета) [Иконников, 2006, 11 : 261 – для Центрального флористического района Восточной Европы не указан; Майоров, 2006 : 229 – указан лишь для Брянской и Тверской областей].

12.34. *Gypsophila juzepczukii* Иконн. – Иконников, 1979 : 146 (Жигули) [Иконников, 2004, 11 : 264; Плаксина, 2001 : 124; Саксонов, 2005 : 155].

12.35. *Gypsophila paniculata* L. – Паллас <1769> (Сергиевск) [Иконников, 2004, 11 : 263; Плаксина, 2001 : 125; Саксонов, 2005 : 156; Майоров, 2006 : 229]

12.36. *Gypsophila zhidulensis* Краснова – Краснова, 1971 : 96 (Жигули) [Иконников, 2004, 11 : 261; Плаксина, 2001 : 124; Саксонов, 2005 : 156; Майоров, 2006 : 229 – синонимизирован с *G. altissima*].

12.37. *Gypsophila perfoliata* L. – Васюков, Иванова, Саксонов, Сенатор, 2008 (г. Самара, ж.д. станция Звезда) [Иконников, 2004, 11 : 263; Майоров, 2006 : 228].

13.38. *Holosteum umbellatum* L. – Клаус, 1852 : 75 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 172; Терехов, 1969 : 340; Плаксина, 2001 : 120].

14.39. *Hylebia nemorum* (L.) Fourg. (*Stellaria nemorum* L.) – Флеров <1905> (Жигули), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 250 [Цвелев, 2004, 11 : 153; Плаксина, 2001 : 119; Саксонов, 2005 : 162; Майоров, 2006 : 218].

15.40. *Lychnis chalconica* L. – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Крупкина, 2004, 11 : 215; Плаксина, 2001 : 124; Саксонов, 2005 : 157; Новиков, 2006 : 225].

16.41. *Melandrium album* (Mill.) Gracke (*M. pratense* Roehl.) – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 219; Терехов, 1969 : 347; Плаксина, 2001 : 122; Саксонов, 2005 : 157; Майоров, 2006 : 225].

17.42. *Minuartia setacea* (Thuill.) Hayek – Цвелев, 2004, 11 : 201 (бассейн р. Сызрань) [Плаксина, 2001 : 120; Майоров, 2006 : 221].

18.43. *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl. – Клаус, 1852 : 74 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 175; Терехов, 1969 : 344; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 157; Майоров, 2006 : 222].

19.44. *Moehringia trinervia* (L.) Clair. – Клаус, 1852 : 73 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 176; Терехов, 1969 : 344; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 157; Майоров, 2006 : 222].

20.45. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench (*Malachium aquaticum* Fries) – Клаус, 1852 : 75 (Сергиевск) [Соколова, 2004, 11 : 156; Терехов, 1969 : 344; Плаксина, 2001 : 120; Саксонов, 2005 : 157; Майоров, 2006 : 218].

21.46. *Oberna behen* (L.) Ikonn. (*Silene inflata* (Salisb.) Smith; *S. vulgaris* (Moench) Garcke) – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 231; Терехов, 1969 : 348; Плаксина, 2001 : 123; Саксонов, 2005 : 158; Майоров, 2006 : 226].

21.47. *Oberna procumbens* (Murr.) Ikonn. (*Silene procumbens* Murr.) – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 233; Терехов, 1969 : 348; Плаксина, 2001 : 123; Саксонов, 2005 : 158; Майоров, 2006 : 226].

22.48. *Otites baschkirorum* (Janisch.) Stank (*Silene baschkorum* Janisch.) – Черепнин, <1941> (Жигулевский заповедник), цит. по Саксонов, 2005 : 158 [Цвелев, 2004, 11 : 255; Плаксина, 2001 : 123; Майоров, 2006 : 227].

22.49. *Otites borystenica* (Grun.) Klok. (*Silene otites* Sm.; *Silene parviflora* (Echerh.) Pers.) – Клаус, 1852 : 71 [Цвелев, 2004, 11 : 251; Саксонов, 2005 : 158; Плаксина, 2001 : 124; Майоров, 2006 : 227].

22.50. *Otites chersonensis* (Zapl.) Klok. – Плаксина, 2001 : 123 (без точного указания на место произрастания) [Цвелев, 2004, 11 : 252; Майоров, 2006 : 227].

22.51. *Otites sibirica* (L.) Raf. (*Silene sibirica* (L.) Pers. – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 250; Плаксина, 2001 : 123; Майоров, 2006 : 228].

22.52. *Otites wolgensis* (Hornem.) Grossh. (*Silene wolgensis* (Hornem.) Oth.) – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 254; Плаксина, 2001 : 124; Саксонов, 2005 : 159; Майоров, 2006 : 227].

23.53. *Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. (*Gypsophila muralis* L.) – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Иконников, 2004, 11 : 266; Терехов, 1969 : 345; Плаксина, 2001 : 125; Саксонов, 2005 : 159; Майоров, 2006 : 228].

24.54. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl. – Плаксина, 2001 : 120 (Высокое Заволжье)

24.55. *Sagina procumbens* L. – Саксонов, 2005 : 159 (Жигулевский заповедник) [Цвелев, 2004, 11 : 189; Плаксина, 2001 : 120; Майоров, 2006 : 221].

25.56. *Saponaria officinalis* L. – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Крупкина, 2004, 11 : 269; Терехов, 1969 : 351; Плаксина, 2001 : 126; Саксонов, 2005 : 159; Майоров, 2006 : 232].

26.57. *Sceleratus annus* L. – Клаус, <1852> (Сергиевск) цит. по Шишкин, 1930, 4 : 277 [Цвелев, 2004, 11 : 205; Терехов, 1969 : 340; Плаксина, 2001 : 122; Саксонов, 2005 : 160].

27.58. *Silene атоена* L. (*S. repens* Patrin) – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 243; Плаксина, 2001 : 123; Саксонов, 2005 : 160; Майоров, 2006 : 226].

27.59. *Silene chlorantha* (Willd.) Ehrh. – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 240; Плаксина, 2001 : 122; Саксонов, 2005 : 160; Майоров, 2006 : 228].

27.60. *Silene dichotoma* Ehrh. – Саксонов, 2005 : 160 (Жигулевский заповедник) [Цвелев, 2004, 11 : 246; Плаксина, 2001 : 122; Майоров, 2006 : 228].

27.61. *Silene nutans* L. – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 238; Терехов, 1969 : 348; Плаксина, 2001 : 123; Саксонов, 2005 : 160; Майоров, 2006 : 227].

27.62. *Silene stepicola* Kleop. (*S. multiflora* (Ehrh.) Pers.) – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 239; Плаксина, 2001 : 123; Майоров, 2006 : 228].

27.63. *Silene tatarica* (L.) Pers. – Клаус, 1852 : 71 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 240; Плаксина, 2001 : 123; Саксонов, 2005 : 161; Майоров, 2006 : 228].

27.64. *Stellaria crassifolia* Ehrh. – Пабо, <1852> (Сергиевск), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 254 ; [Цвелев, 2004, 11 : 240; Плаксина, 2001 : 119; Майоров, 2006 : 219].

27.65. *Stellaria graminea* L. – Клаус, 1852 : 74 [Цвелев, 2004, 11 : 150; Терехов, 1969 : 341; Саксонов, 2005 : 162; Плаксина, 2001 : 119; Майоров, 2006 : 220].

27.66. *Stellaria hebecalyx* Fenzl. – Терехов, 1969 : 341 (Самарская Лука, оз. Шелехметь) [Цвелев, 2004, 11 : 149; Плаксина, 2001 : 119; Майоров, 2006 : 219].

27.67. *Stellaria holostea* L. – Клаус, 1852 : 74 (Сергиевск) [Цвелев, 2004, 11 : 148; Терехов, 1969 : 341; Саксонов, 2005 : 162; Майоров, 2006 : 219].

27.68. *Stellaria palustris* Retz. – Терехов, 1969 : 342 (без точного указания места произрастания) [Цвелев, 2004, 11 : 148; Плаксина, 2001 : 119; Саксонов, 2005 : 162; Майоров, 2006 : 219].

27.69. *Stellaria caespitosa* Gikib. – Пабо, <1852> (Сергиевск), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 258.

28.70. *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert (*V. segetalis* (Neck.) Garcke – Коржинский, 1898 : 65 [Крупкина, 2004, 11 : 270; Терехов, 1969 : 351; Саксонов, 2005 : 163; Майоров, 2006 : 230].

29.71. *Viscaria viscosa* (Scop.) Aschers. (*V. vulgaris* Bernh.) – Клаус, 1852 : 72 (Сергиевск) [Иконников, 2004, 11 : 207; Терехов, 1969 : 347; Плаксина, 2001 : 122; Саксонов, 2005 : 163; Новиков, 2006 : 224].

## ILLECEBRACEAE

1.72. *Herniaria glabra* L. – Пабо, <1852> (Сергиевск), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 275 [Цвелев, 2004, 11 : 136; Терехов, 1969 : 339; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 156; Майоров, 2005 : 223].

1.73. *Herniaria polygama* J. Gey (*H. odorata* Andrzej. ex J. Gay) – Софинский <1903>, цит. по Шишкин, 1930, 4 : 275 [Цвелев, 2004, 11 : 136;

Терехов, 1969 : 339; Саксонов, 2005 : 156; Майоров, 2005 : 223 – для Самарской области не указан].

1.74. *Herniaria besseri* Fisch. ex Hornem. (*H. inasana* Lam.) – Плаксина, 2001: 121 (Общий Сырт) [Цвелев, 2004, 11 : 136].

2.75. *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl. (*S. campestris* (L.) Aschers.) – Паллас, <1769> (Сызрань) цит. по Шишкин, 1930, 4 : 273 [Цвелев, 2004, 11 : 130; Терехов, 1969 : 342; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 161; Майоров, 2006 : 223].

2.76. *Spergularia salina* J. et C. Presl. – Янишевский, <1903> (Усолье), цит. по Шишкин, 1930, 4 : 272 [Цвелев, 2004, 11 : 130; Терехов, 1969 : 342; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 161; Майоров, 2005 : 223 – для Самарской области не указан].

3.78. *Spergula arvensis* L. – Коржинский, 1898 : 73 (без точного указания на место произрастания) [Цвелев, 2004, 11 : 126; Терехов, 1969 : 244; Плаксина, 2001 : 121; Саксонов, 2005 : 161; Майоров, 2006 : 223].

3.79. *Spergula maxima* Weihe – Терехов, 1969 – 344 (в посевах льна, без точного указания на место произрастания) [Цвелев, 2004, 11 : 126; Майоров, 2005 : 223 – синонимизирован с *S. Arvensis* L.].

3.80. *Spergula sativa* Voenn. – Терехов, 1969 : 344 (сорное, без точного указания на место произрастания) [Цвелев, 2004, 11 : 126; Майоров, 2005 : 223 – синонимизирован с *S. arvensis* L.].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Васюков В.М., Иванова А.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А.** Флористические находки на железных дорогах Самарской области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований: Материалы Международной конференции, посвященной 90-летию Воронежского государственного университета и 50-летию Воронежского отделения Русского ботанического общества (6-7 февраля 2008 г.) в печати.

**Горелов М.С., Матвеев В.И., Симакова Н.С., Устинова А.А.** Новые данные о флоре Куйбышевской области // Бот. журн. 1977. Т. 62. № 9. С. 1330-1331.

**Егорова Т.В.** Сем. 178. Сурегасеae Juss. – Осоковые // Флора европейской части СССР. Т. 2. Л.: Наука, 1976. С. 83-219. – **Еленевский А.Г., Куранова Н.Г.** 26. *Dianthus* L. – Гвоздика // Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. Изд. 10-е исправ. и доп. М.: КМК, 2006. С. 230-232. – **Еленевский А.Г., Куранова Н.Г.** 8. *Arenaria* L. – Песчанка // Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. Изд. 10-е исправ. и доп. М.: КМК, 2006. С. 222.

**Иконников С.С.** Род 10. Пустынница – *Eremogone* Fenzl // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 176-180. – **Иконников С.С.** Род 18. Смолка – *Viscaria* Bernh. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 206-207. – **Иконников С.С.** Род 41. Качим – *Gypsophila* L. – Род 42. Песколюбочка – *Psammophilella* Ikonn. L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 257-266.

**Клаус К.** Флоры местные приволжских стран. СПб., 1852. 312 с. – **Кривошеева М.Г.** Осоки Куйбышевской области // Ботаника и сельское хозяйство: Учен. Зап. Куйбышев. пед. ин-та. 1961. Вып. 35. С.33-29. – **Крупкина Л.И.** Род 21. Кукушкин цвет – *Cossyganthe* (Reichenb.) Reichenb. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 209-210. – **Крупкина Л.И.** Род 24. Куколь – *Agrostemma* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 212-213. – **Крупкина Л.И.** Род 25. Зорька,

Лихнис – *Lichnis* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 213-215. – **Крупкина Л.И.** Род 36. Волдырник – *Cuscutalula* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 228-229. – **Крупкина Л.И.** Род 46. Мыльнянка – *Saponaria* L. - Род 47. Тысячеголов – *Vaccaria* N.M. Wolf // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 268-271. – **Кузьмина М.Л.** Род 50. Гвоздика – *Dianthus* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 273-297.

**Литвинов Д.И.** Сем. XVIII *Scrophulariaceae*. Осоковые // Флора юго-востока Европейской части СССР. Вып. 3. Л.: ГБС, 1929. С. 257-273, 280-315.

**Майоров С.В.** Сем. 56. *Caryophyllaceae* Juss. – Гвоздичные // Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. Изд. 10-е исправ. и доп. М.: КМК, 2006. С. 216-232. (За исключением родов *Arenaria*, *Dianthus*, *Coronaria*, *Lychnis*, *Steris*, *Plesonax*). – **Матвеев В.И.** Флора водоемов Средней Волги и ее притоков // Учен. зап. Куйбышевского пед. ин-та. 1969. Вып. 68. С. 91-99.

**Новиков В.С.** 14. *Steris Rafin* – Смолка // Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. Изд. 10-е исправ. и доп. М.: КМК, 2006. С. 224. – **Новиков В.С.** 19. *Coronaria* L. – Горичвет - 20. *Lychnis* L. – Зорька // Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. Изд. 10-е исправ. и доп. М.: КМК, 2006. С. 225.

**Плаксина Т.И.** Конспект флоры Волго-Уральского региона. Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2001. 388 с. – **Плаксина Т.И.** Новые виды во флоре Жигулевского госзаповедника им. И.И. Спрыгина // Интродукция, акклиматизация, охрана и использование растений. Куйбышев, 1982. С. 74-77.

**Саксонов С.В.** Ресурсы флоры Самарской Луки. Самара: Изд-во Самар. НЦ РАН, 2005. 416 с. – **Саксонов С.В., Конева Н.В.** Конспект семейства Сытевых (*Scrophulariaceae*) Самарской области // Изв. СНЦ РАН. 2005. Спец. вып. 4 «Актуальные проблемы экологии». С. 190-204. – **Саксонов С.В., Силаева Т.Б., Юрицына Н.А.** Новые и редкие растения Приволжской возвышенности в Самарской и Ульяновской областях // Бюллетень ГБС. Вып. 191. М.: Наука, 2006. С. 87-97. – **Соколова И.В.** Род 4. Мягковолосник – *Myosoton* Moench // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 155-156. – **Соколова И.В.** Род 6. Ясколка – *Cerastium* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 157-171. – **Соловьева В.В., Саксонов С.В.** Флористический мониторинг малых искусственных водоемов Самарской области (2001-2005 гг.) // Поволжский экологический журнал. 2006. № 2/3. С. 188-195.

**Татанов И.В.** Сем 28. *Scrophulariaceae* Juss. // Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. Изд. 10-е исправ. и доп. М.: КМК, 2006. С. 121-141. – **Терехов А.Ф.** Определитель весенних и осенних растений Среднего Поволжья и Заволжья. Куйбышев: Кн. изд-во. 464 с.

**Цвелев Н.Н.** Род 1. Звездчатка – *Stellaria* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 145-152. - Род 3. Мокрица – *Alsine* L // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 143-155. – **Цвелев Н.Н.** Род 13. Песчанка – *Arenaria* L. - Род 15. Минуарция – *Minuartia* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 182-203. – **Цвелев Н.Н.** Род 17. Дивала – *Scleranthus* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 203-206. – **Цвелев Н.Н.** Род 28. Дрема – *Melandrium* Röhl. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 218-220. – **Цвелев Н.Н.** Род 30. Ночецветка – *Elisanthe* (Fenzl) Fenzl - Род 31. Лжесмолка – *Carpophora* Klotzsch // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 224-225. – **Цвелев Н.Н.** Род 37. Хлопушка – *Oberna* Adans. - Род 39. Ушанка – *Otitis* Adans. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 229-256. – **Цвелев Н.Н.** Род 7. Костенец – *Holosteum* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 171-173. – **Цвелев Н.Н.** Род 9. Мерингия – *Moehringia* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11. М.-СПб: КМК, 2004. С. 174-176. – **Цизерлинг Ю.Д.** 98.

*Heleocharis R.* Вг. Ситняг // Флора юго-востока Европейской части СССР. Вып. 3. Л.: ГБС, 1929. С. 273-280.

**Шишкин Б.К.** Сем. XLI. Caryophyllaceae – Гвоздичные // Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. М.-Л., 1941. С. 326-352.

**Юзепчук С.В.** Песчаные гвоздики Среднего Поволжья // Ботанические материалы гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Т. 13. М.-Л., 1950.

**Korzhinsky S.** Tentamen florum Rossiae orientalis, id est provinciarum Kazan, Wiatka, Perm, Ufa, Orenburg, Samara partis borealis atque Simbirsk. St.-Petersb. 1898. XIX. 566 с. (Зап. Акад. наук. Сер. 8 по физ. мат. отд. Т. 7. № 1).

Поступила в редакцию  
29 декабря 2007 г.